

تضييق المهبل

إن الهدف الكامن وراء عملية تضييق المهبل هو إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل عملية الوضع.

قبل العملية بساعة واحدة تتعاطى المرأة دواء مخفف للأوجاع، أي مستحضر يعطى قبل المعالجة. تتم العملية تحت تخدير شامل أو تخدير موضعي سويا مع مستحضر مهدئ.

خلال العملية يتم استئصال قطعة مثلثة الشكل من الجدار الخلفي للمهبل. بعد ذلك يتم عمل تقوية لعضلات قاع الحوض وفي النهاية يتم خياطة أطراف الغشاء المخاطي سويا.

يمكن أن تشعر المرأة بنوع من الألم خلال الايام الأولى التالية للعملية. في هذه الحالة نوصي بالتنظيف الشخصي العادي باستعمال الصابون والماء. يمكن أن يتطلب الأمر إلى استراحة مرضية بهدف تخفيف العبء على المرأة. يمكن العودة لممارسة المعاشرة الجنسية بعد شهر واحد تقريبا.

يوتيبوري الموافق ٢٠٠٢/٧/٢١

بتر أوجوم
طبيب مرخص
أخصائي في أمراض النساء/التوليد

تصغير الشفرين الأصغرين للمهبل

قبل العملية بساعة واحدة تتعاطى المرأة دواء مخفف للأوجاع، اي مستحضر يعطى قبل المعالجة. تتم العملية تحت تخدير شامل أو تخدير موضعي سويا مع مستحضر مهدئ.

يتم تصغير الشفرين الأصغرين للمهبل (شفتي المهبل الداخلية) بحيث يصبحا على مستوى واحد أو في موضع في الجهة الداخلية من الشفرين الأعظمين. يتم إما عمل تصغير على طول الشفرين الأصغرين أو عمل تصغير على شكل حرف V. يتم بعد ذلك خياطة أطراف الجهة الخلفية سويا. عند استخدام الاسلوب المذكور أخيرا تتم المحافظة على التضاريس الظاهرة.

لا تشمل عملية التجميل البظر ولا يصاب بتلف من جرائها.

نوصي بعد العملية عمل التنظيف الشخصي العادي باستعمال الصابون والماء والامتناع عن المعاشرة الجنسية حوالي ٤ أسابيع. تسقط الخيوط ذاتيا أو تزول من الوجود.

يوثيبوري الموافق ٢٠٠٢/٧/٢١

بتر أوجوم
طبيب مرخص
أخصائي في أمراض النساء/التوليد

City Laser
Göteborg

إعادة تشكيل غشاء البكارة

قبل العملية بساعة واحدة تتعاطى المرأة دواء مخفف للأوجاع. تتم العملية تحت تخدير شامل أو تخدير موضعي سويا مع مستحضر مهدئ.

يتم إعادة تشكيل غشاء البكارة بحيث يستعيد شكله السابق على شكل لوح حلقي مع فتحة في المنتصف.

بعد العملية نوصي بالتنظيف الشخصي العادي باستعمال الصابون. تسقط الخيوط ذاتيا أو تزول من الوجود.

يوتيبوري الموافق ٢٠٠٢/٧/٢١

بتر أوجوم
طبيب مرخص
أخصائي في أمراض النساء/التوليد