

بازسازی و به حالت اول برگرداندن پرده بکارت

یک ساعت قبل از عمل جراحی، داروی مسکن درد استفاده میشود.
خود عمل جراحی زیر بیهوشی و یا بی حسی موضعی توأم با داروی بی حسی انجام میگردد.
پرده بکارت آنطور بازسازی میشود که شکل آن بصورت یک سطحی نازک از بافتها و نسوج حلقه مانند با یک منفذ در وسط آن برگردد.
بعد از عمل جراحی، مراعات معمول بهداشتی استفاده از آب و صابون توصیه میشود.
نخهای بخیه یا میافتنند و یا خود از بین میروند.

یوتوبوری ۲۰۰۲ - ۲۱/۷

پتر اورگوم (Petter Orgum)
دکتر متخصص در زنان و زایمان

سیتی لیزر (City Laser)
یوتوبوری (Göteborg)

باریک کردن دهانه رحم (زهدان)

هدف از عمل جراحی تتگ کردن دهانه زهدان، برگشت دادن آن به حالت اولیه قبل از زایمان است. یک ساعت قبل از عمل جراحی، داروی مسکن درد استفاده میشود که به آن مصرف داروی مقدماتی میگویند. خود عمل جراحی زیر بیهوشی، یا بی حسی در ناحیه کمر و یا بی حسی موضعی توأم با داروی بی حسی انجام میگردد.

در این عمل جراحی، یک تکه سه گوشه مانند از دیواره عقب زهدان برداشته میشود. در این حالت ماهیچه های انتهای تحتانی لگن خاصره قوی تر میشود و در آخر عمل، پوسته مخاطی بهم دوخته میشود. احتمال چند روزی درد داشتن پس از عمل جراحی وجود دارد. بعد از عمل جراحی، مراعات معمول بهداشتی استفاده از آب و صابون توصیه میشود. مرخصی استعلاجی جهت سبک تر کردن فشار جراحی نیز میتواند ضروری شود. نزدیکی جنسی را حدودا پس از یک ماه میتوان از سر گرفت.

یوتوبوری ۲۰۰۲ - ۲۱/۷

پتر اورگوم (Petter Orgum)
دکتر متخصص در زنان و زایمان

کاستن از لب های قسمت درونی آلت تناسلی (شرمگاه)

یک ساعت قبل از عمل جراحی، داروی مسکن درد استفاده میشود که به آن مصرف داروی مقدماتی میگویند. خود عمل جراحی زیر بیهوشی، و یا بی حسی موضعی توأم با داروی بی حسی انجام میگردد.

این عمل به این صورت است که از ناحیه درونی لبهای شرمگاه کاسته میشود بطوری که آنها، در سطح و یا در پشت قسمت بیرونی لبهای شرمگاه قرار بگیرند. این کار یا از طریق کاستن و کم کردن در امتداد طولی است و یا بصورت یک کاهش بشکل هفت مانند (V- formed) در وسط لبهای مهبل میباشد. قسمت جلویی و عقبی بعداً بهم دوخته میشود. در این متد ذکر شده اخیر، سعی میشود که خط برجسته و طرح نمایان آن حفظ شود.

قسمت حساس شرمگاه (Klitoris) از پلاستیک احاطه نمیشود و صدمه نمی بیند.

بعد از عمل جراحی، مراعات معمول بهداشتی استفاده از آب و صابون توصیه میشود. نزدیکی جنسی را حدوداً پس از چهار هفته میتوان از سر گرفت. نخهای بخیه یا میافتند و یا خود از بین میروند.

یوتوبوری ۲۰۰۲ - ۲۱/۷

پتر اورگوم (Petter Orgum)
دکتر متخصص در زنان و زایمان