

City Laser
г. Гетеборг

Реконструкция девственной плевы

За 1 час до операции принимаются обезболивающие средства. Операция проводится под общим наркозом или местной анестезией в сочетании с расслабляющими средствами.

Девственная плева реконструируется таким образом, что она вновь принимает вид тонкой кольцеобразной пленки с отверстием посередине.

После операции рекомендуется соблюдать обычные правила гигиены с использованием воды с мылом. Нити выпадают или рассасываются.

г. Гетеборг, 21 июня 2002

Петтер Оргум
Дипломированный врач
Специализация: гинекология/акушерство

City Laser
г. Гетеборг

Уменьшение влагалищного отверстия

Целью операции по уменьшению влагалищного отверстия является восстановление предродовых размеров.

За 1 час до операции принимаются обезболивающие средства, т.е. проводится предварительный прием лекарств. Операция проводится под общим наркозом, анестезией спины или местной анестезией в сочетании с расслабляющими средствами.

В ходе операции удаляется треугольная формация задней стенки влагалища с последующим укреплением мускулатуры дна таза.

После операции возможны болевые ощущения в течение нескольких дней. Рекомендуется соблюдать обычные правила гигиены с использованием воды с мылом. Для снижения нагрузки желательно взять больничный лист. Половые отношения могут быть возобновлены приблизительно через 1 месяц.

г. Гетеборг, 21 июня 2002

Петтер Оргум
Дипломированный врач
Специализация: гинекология/акушерство

City Laser
г. Гетеборг

Уменьшение внутренних срамных губ

За 1 час до операции принимаются обезболивающие средства, т.е. проводится предварительный прием лекарств. Операция проводится под общим наркозом или местной анестезией в сочетании с расслабляющими средствами.

Внутренние срамные губы уменьшаются таким образом, что они становятся на одном уровне или ниже уровня внешних срамных губ. Уменьшение производится посредством продольного рассечения или V-образного разреза по центру половых губ с последующим сшиванием. При использовании последнего метода видимые контуры сохраняются неизменными.

Клиитор не охватывается пластической операцией, и он остается неповрежденным.

После операции рекомендуется соблюдать обычные правила гигиены с использованием воды с мылом, а также воздержаться от половых сношений в течение 4-х недель. Нити выпадают или рассасываются.

г. Гетеборг, 21 июня 2002

Петтер Оргум
Дипломированный врач
Специализация: гинекология/акушерство